



Síguenos en nuestras redes sociales:

CALIFICACIÓN DE COMEDEROS

La evaluación diaria del comedero es una actividad obligatoria que el responsable del establo o del programa de alimentación debe implementar. Un buen momento para revisar los comederos es una hora antes del siguiente suministro de alimento, independientemente de que los animales sean alimentados una, dos o varias veces al día.

Esta calificación se realiza acercándose y viendo físicamente el comedero y el comportamiento del ganado al momento de la lectura.




BATTILANA


Tus aliados en nutrición



CALIFICACIÓN
SEGÚN LECTURA
DEL COMEDERO



COMEDERO SIN
ALIMENTO Y
LAMIDO.



GANADO
AGRESIVO




Algunos
animales
mugen



El 75% de los
animales están
junto al comedero.



El resto de los animales
están esperando que
pase el repartidor para
acercarse o incorporarse
al comedero.



INTERVENCIÓN


GANADO SUBALIMENTADO. Verifique la materia seca (MS) del forraje y el programa de alimentación. Ajustar la MS de ser necesario. Si la MS es la correcta, incremente la ración total de 5 a 10%.

Si califica el comedero y este está sin alimento (no lamido y los animales no muestran comportamiento agresivo) 10 minutos antes del siguiente reparto o a la mitad de la operación de limpieza del comedero, puede considerarse como una lectura apropiada.


EQUIPO TÉCNICO DE BATTILANA NUTRICIÓN
Para mayor información visítanos en: www.battilana.biz

CALIFICACIÓN
SEGÚN LECTURA
DEL COMEDERO

1



COMEDERO CON
ALIMENTO SOBRANTE
DESPARRAMADO (MENOS
DE 5% DE LA CANTIDAD
SUMINISTRADA)



GANADO
NORMAL



A.

El ganado
se encuentra
alerta.



B.

El 25% de los
animales están
junto al comedero.



C.

El 50% se
incorpora al
pasar el operario
o el repartidor.



D.

El resto
permanece
descansando.



INTERVENCIÓN

GANADO SUBALIMENTADO. Verifique la materia seca del forraje y ajústela de ser necesario para completar su contenido en la ración. Si la materia seca es la correcta, incremente la ración total en un 5%.

Cuando las vacas están comiendo el último 5% del alimento, habrá algunas, si no es que todas, que no estén comiendo a su máxima capacidad. Cuando bajamos al último 5%, usualmente hay forraje (que es menos apetitoso) que está echado a perder o que es de calidad inferior. Las vacas, por lo general, apartan estas porciones de forraje y, si hay amplia disponibilidad de forraje, no se lo comen y lo dejan como desperdicio. Cuando se fuerza a consumir este alimento, existe la percepción de que las vacas están hambrientas. Ese alimento es, en el mayor de los casos, de menor digestibilidad y reducirá la ingesta de las vacas. **Es importante no incrementar el alimento en días consecutivos.**

EQUIPO TÉCNICO DE BATTILANA NUTRICIÓN
Para mayor información visítanos en: www.battilana.biz



BATTILANA
Tus aliados en nutrición




Síguenos en nuestras redes sociales:

CALIFICACIÓN
SEGÚN LECTURA
DEL COMEDERO :

2



CAPA DELGADA
SOBRANTE (5 A
10% DEL ALIMENTO
SUMINISTRADO)



GANADO
TRANQUILO



El 50% del ganado
está echado en el
corral y rumiando.



El 15% del
ganado está en
el comedero.



El resto del
ganado está en
otras actividades.



INTERVENCIÓN

CALIFICACIÓN ADECUADA. Se está maximizando la ingesta del alimento. Mantener la misma cantidad de suministro de alimento.




Síguenos en nuestras redes sociales:

EQUIPO TÉCNICO DE BATTILANA NUTRICIÓN
Para mayor información visítanos en: www.battilana.biz



BATTILANA
Tus aliados en nutrición

CALIFICACIÓN
SEGÚN LECTURA
DEL COMEDERO :

3



UNA CAPA
DELGADA DE 5 A
7.5 CENTÍMETROS
(ALREDEDOR DEL
25% DEL TOTAL
OFRECIDO).



GANADO
TRANQUILO




Más del 60% del
ganado echado en
el corral y rumiando.



El 20% del ganado
se incorpora al
pasar repartidor.




El 20% del
ganado está en
otras actividades




INTERVENCIÓN

SOBRE ALIMENTACIÓN. Reducir el suministro de alimento en 5% respecto al día anterior. Revisar la materia seca de la fuente forrajera y el programa de alimentación para determinar cuál es la razón de este excedente de alimento.

EQUIPO TÉCNICO DE BATTILANA NUTRICIÓN
Para mayor información visítanos en: www.battilana.biz



REMANENTE DE 7.5 O
MÁS CENTÍMETROS
(ALREDEDOR DEL
50% DE LA CANTIDAD
SUMINISTRADA).



GANADO
TRANQUILO



Más del 60% del
ganado está
echado en el corral.



El 15% del
ganado se
incorpora.



El 25% del
ganado está en
otras actividades




INTERVENCIÓN

PROBLEMAS SERIOS DE ALIMENTACIÓN. Suspender el primer suministro y corregir error. Revisar los últimos cambios realizados en ese lote o corral.


Esta lectura se asocia a accidentes en los corrales, falta de agua, errores de suministro y/o fallas de comunicación - planificación. Las condiciones climatológicas y otros factores de manejo, como vacunaciones y pruebas masivas que pueden afectar la ingestión de materia seca y llevar a fluctuaciones.

CALIFICACIÓN
SEGÚN LECTURA
DEL COMEDERO

5




ALIMENTO
INTACTO



GANADO
TRANQUILO




Más del 70% del
ganado está
echado en el corral.



El 5% del
ganado se
incorpora.



El 25% del
ganado está en
otras actividades



INTERVENCIÓN

PROBLEMAS SERIOS DE ALIMENTACIÓN. Revisar hoja de reparto, horario de suministro y optimizar rutas.

Esta lectura se asocia a horarios inadecuados de reparto y proporcionalidad entre los mismos, además de lo indicado en la lectura de comedero **4**.

EQUIPO TÉCNICO DE BATTILANA NUTRICIÓN
Para mayor información visítanos en: www.battilana.biz